



Alta prevalencia de ITS asintomáticas en HSH con infección por VIH en España.

Rein Willekens, Irene Sánchez, Lucía Miguel, Juliana Esperalba, Vicenç Falcó, Joaquín Burgos, Jordi Navarro, Inma Ocaña, Esteban Ribera, Mario Martín, Estrella Caballero, Adrian Curran.

Introducción

- **Alta prevalencia de ITS asintomáticas** como **Sífilis**, ***C. trachomatis*** (CT) y ***N. gonorrhoeae*** (NG) en HSH sexualmente activos con infección por VIH.
- Guías clínicas actuales^{1,2} recomiendan **cribaje al menos anualmente**.
- Datos limitados en nuestro medio.

Objetivos

- Estudiar la **prevalencia y características** de las **ITS asintomáticas** en **HSH con infección por VIH**.
- Evaluar si el cribaje de ITS es evitable en un subgrupo de pacientes.


¹ CDC Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2015.

² **GESIDA**: Documento de consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las ITS en adultos, niños y adolescentes, marzo 2017.

Metodología

- **Estudio de cohorte prospectivo** unicéntrico en el Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona.
- Inclusión consecutiva de **HSH asintomáticos** que acudían a **visitas regulares de VIH** entre diciembre/2014 - agosto/2017.
- **Criterios de exclusión:** cribado incompleto, síntomas de ITS o antibiótico activo frente a ITS en el mes anterior.
- Todos los pacientes completaron un **cuestionario** (comportamiento sexual y drogas) y se recogieron datos demográficos y clínicos.
- **Recogida:** Frotis faríngeos/rectales + orina primera micción → PCR **CT y NG** y serologías de **Sífilis y VHC**.

Resultados



ITS	Frecuencia (n)
Sífilis	29
CT	18
Rectal	10
Faríngeo	4
Orina	4
NG	10
Rectal	5
Faríngeo	5
Orina	0
VHC	3
LGV	1
TOTAL	61



VARIABLES	SIN ITS (n=217)	CON ITS (n=52)	p	OR
Edad, mediana (RIC)	43 (37 - 49)	39 (36 - 45)	0.040	0.965
Nacido en España	65 %	52 %	0.093	1.684
Nº contactos últimos 12 meses, mediana (RIC)	1 (1 - 5)	3 (1 - 8)	0.023	1.052
Pareja nueva últimos 3 meses	39 %	45 %	0.415	1.292
Pareja estable cerrada	37 %	26 %	0.124	0.584
Uso de preservativo				
Siempre sexo anal	52 %	58 %	0.468	1.254
Siempre sexo anal y oral	12 %	6 %	0.258	0.495
Uso de Internet / Apps móviles	51 %	67 %	0.049	1.891
Consumo de drogas durante el sexo	21 %	39 %	0.010	2.296
ITS previa	70 %	77 %	0.295	1.457
ITS último año	10 %	24 %	0.012	2.829
Cribado de ITS previo	23 %	40 %	0.014	2.286
Carga viral indetectable	83 %	85 %	0.772	1.131

CONCLUSIONES

Hubo una alta prevalencia de ITS asintomáticas en HSH con infección por VIH estable que asisten a controles regulares.

Nuestros resultados refuerzan la recomendación del cribado periódico en todos los HSH sexualmente activos con infección por VIH en nuestro medio.

Gracias por su atención